

# حبوب منع الحمل قد تؤدي للعمى

<"xml encoding="UTF-8?>



أثبتت الأبحاث التي أجريت مؤخرا في بريطانيا أن احتمال وقوع حالات مؤدية إلى العمى لدى النساء اللواتي يتناولن حبوب منع الحمل لفترة أطول من ثلاث سنوات يزداد مرتين.

تحدث حالات الزرق (الغلوكونوما) عند انسداد مسالك تصريف السائل داخل العين مما يؤدي إلى ازدياد الضغط فيها وبالتالي إلى تضرر العصب البصري وشبكة العين. ويبحث الباحثون أطباء الأمراض النسائية وأمراض العين لتحذير من يراجعهم من النساء بمخاطر تناول حبوب منع الحمل وذلك علما بأن مرض الغلوكونوما لا يمكن علاج مضاعفاته ومن الممكن إيقاف تطوره في حال تشخيصه في مرحلته الابتدائية فقط.

في بريطانيا وحدها يعاني أكثر من ٤٨٠ ألف شخص من أكثر أنواع الغلوكونوما انتشارا. ويتمني الأطباء أن يكون هذا البحث بمثابة دافع لإجراء دراسات لاحقة على نطاق أوسع من أجل اكتساب معلومات أكثر حول الانعكاسات الجانبية لتناول حبوب منع الحمل على صحة المرأة.